

HERNIA DE PETERSEN SINTOMÁTICA POSTERIOR A ABDOMINOPLASTIA EN PACIENTE POSTBARIÁTRICA: REPORTE DE CASO

Silvia Cardona Cote¹, César García Nuñez², Karen Díaz-Santamaría³, Diana Tovar González⁴.

¹ Cirujana plástica reconstructiva y estética, Hospital Internacional de Colombia.

² Cirujano general, Hospital Internacional de Colombia.

³ Residente de cirugía plástica, reconstructiva y estética, Universidad Industrial de Santander.




⁴ Médica general, servicio de cirugía plástica, Hospital Internacional de Colombia.

INTRODUCCIÓN

La hernia de Petersen es una variante de hernia interna que ocurre a través del espacio potencial localizado entre el mesenterio del asa alimentaria y el mesocolon transverso en reconstrucciones gastrointestinales en Y de Roux con trayecto antecólico. Descrita en 1900 posterior a gastrectomías parciales, actualmente representa una complicación tardía tras bypass gástrico laparoscópico.

Presentamos el segundo caso reportado en la literatura mundial de una paciente con antecedente de bypass gástrico que desarrolló una hernia de Petersen durante el posoperatorio de una abdominoplastia con plicatura abdominal.

CASO CLÍNICO



La abdominoplastia con plicatura podría modificar la complacencia abdominal y aumentar la presión intraabdominal, especialmente con el uso de prendas compresivas. En pacientes con bypass gástrico previo, este escenario puede desenmascarar una hernia interna latente o precipitar sintomatología obstructiva.

CONCLUSIÓN

La hernia de Petersen posterior a abdominoplastia es excepcional, pero potencialmente grave. En pacientes postbariátricos, el dolor abdominal posoperatorio debe interpretarse con una semiología distinta. El diagnóstico oportuno por parte del equipo multidisciplinario puede evitar retrasos diagnósticos, isquemia intestinal, resección intestinal y morbilidad mayor.

REFERENCIAS

