

Síndrome de Parry-Romberg en paciente escolar: A propósito de un caso

Luis Felipe Ruiz Pantoja^{1*}, Laura Marcela Mosquera Salas¹, Rossa Alejandra Sánchez Guerrero², Diego José Caycedo³

¹ Residentes Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., Universidad del Valle, Cali, Colombia.

² Estudiante de 6to año medicina. Escuela de Medicina, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

³ Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., Universidad del Valle, Cali, Colombia.



PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente femenina de 7 años con cuadro clínico que inicia a los 4 años de edad, caracterizado por atrofia progresiva de los tejidos de la hemicara izquierda, valorada por el Servicio de Cirugía Plástica Craneofacial del Hospital Universitario del Valle, se consideró diagnóstico de Síndrome de Parry Romberg; tras la evaluación clínica e imagenológica preoperatoria, se indicó reconstrucción facial mediante lipoinjerto autólogo. Bajo anestesia general, se obtuvieron 68 cc de tejido graso mediante lipoaspiración convencional de abdomen y cara interna de muslos, el cual fue procesado e infiltrado de forma multicapa con cánula roma de 18 G en los planos profundos y superficiales de los tercios medio e inferior de la hemicara izquierda, principalmente en las regiones malar, perioral y mandibular, con el objetivo de restaurar el volumen perdido y mejorar la simetría facial, no se presentaron complicaciones durante el procedimiento.

RESULTADOS

Se observó una mejoría significativa del volumen de los tercios medio e inferior de la hemicara izquierda, con restauración parcial del contorno malar y mandibular. El análisis fotográfico comparativo evidenció disminución de la asimetría facial y mejor balance orbitocigomático y mandibular. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, sin eventos adversos ni complicaciones relacionadas con el procedimiento.



DISCUSIÓN

El síndrome de Parry-Romberg es una entidad poco frecuente que puede producir deformidades faciales progresivas con importantes repercusiones estéticas y psicosociales, especialmente cuando se presenta durante la infancia. En pacientes pediátricos, el lipoinjerto autólogo representa una alternativa reconstructiva de baja morbilidad en comparación con procedimientos más complejos, permitiendo restaurar el volumen facial sin comprometer el crecimiento craneofacial ni generar secuelas significativas en las zonas donantes.

CONCLUSIÓN

El lipoinjerto autólogo es una alternativa reconstructiva segura y eficaz para restaurar el volumen facial en pacientes pediátricos con síndrome de Parry-Romberg, logrando una mejoría estética significativa con baja morbilidad.